

Leitsymptom Handschriftveränderungen

Graphomotorische Reaktionen auf Krankheiten, Arzneimittel, Gifte, Genuss- und Rauschmittel

Übersicht

Teil I

Zusammenfassung

1. Nutzen und Grenzen dieser Leitsymptome
2. Schon prima vista als Schreibstörung verdächtige Einzelmerkmale
 - 2.1 Ataxie-Schrift
 - 2.2 Zitterschrift (Tremor)
 - 2.3 Häufige Verschreibungen, Korrekturen, Flickungen, Buchstaben- und Wortauslassungen oder – Wiederholungen bis zum Formzerfall der Schrift

Teil II

3. Für den chronologischen Schriftvergleich zusätzlich besonders geeignete Veränderungen der Handschrift
 - 3.1 Hinweise zum chronologischen Probenvergleich
 - 3.2 Bewegungsexpansion (Makrographie)
 - 3.3 Bewegungseinschränkung (Mikrographie)
 - 3.4 Zeilenführung
 - 3.5 Wort- und/oder Zeilenabstände
 - 3.6 Weitere Merkmale und ihre Veränderungen

Teil III

4. Erfahrungen mit den graphomotorischen Leitsymptomen
 - 4.1 Krankheiten
 - 4.1.1 Hyperthyreose
 - 4.1.2 Chronische Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen
 - 4.1.3 Ausgewählte Leber- und Nierenerkrankungen
 - 4.1.4 Affektionen im Bereich des Zentralnervensystems
 - 4.1.5 Störungen im Elektrolyt- und Kohlenhydrathaushalt
 - 4.2 Arzneimittel

Teil IV

- 4.3 Gifte
- 4.4 Genussmittel
 - 4.4.1 Alkohol (Ethanol)
 - 4.4.2 Coffein
 - 4.4.3 Nicotin
- 4.5 Halluzinogene und nahestehende Rauschmittel